

Título: Oleozon tópico: alternativa en el tratamiento de la Moniliasis Vaginal.

Dr. Iván Castillo Ledo
Dra. Dinorah Janet Torres Lugo
Dr. Antonio Arístides Ramos Barroso
Policlínico Docente Raúl Suárez Martínez Rodas. Cienfuegos. Cuba



RESULTADOS

Tabla. Distribución de las pacientes del estudio según la edad y el tipo de Tratamiento.

Edad	Tipo de Tratamiento empleado			
	Oleozon Tópico		Convencional	
	No. y %		No. y %	
15 a 20 años	4	20,0%	5	25,0%
21 a 30 años	9	45,0%	8	40,0%
31 a 40 años	5	25,0%	5	25,0%
41 a 49 años	2	10,0%	2	10,0%
Total	20	100,0%	20	100,0%

Tabla Distribución de la evolución del tratamiento según el tipo de Tratamiento

Evolución del tratamiento	Tipo de Tratamiento empleado			
	Oleozón Tópico		Convencional	
	No. y %		No. y %	
Menos de 6 días	19	95,0%	2	10,0%
De 6 días y más	1	5,0%	18	90,0%
Total	20	100,0%	20	100,0%

OBJETIVO

Determinar los resultados del Oleozón tópico en el tratamiento de la Moniliasis Vaginal en pacientes del consultorio No. 1 de Cartagena.



MÉTODO

Tipo de Estudio: Observacional, analítico, prospectivo con un diseño de casos y controles.
Contexto geográfico: Consultorio No. 2 , municipio Rodas, provincia Cienfuegos
Universo: Las 125 féminas comprendidas entre 15 y 49 años que son atendidas en el Consultorio.
Muestra: Las 40 féminas que asistieron al consultorio entre las edades de15 a 49 años aquejándose de síntomas y signos de infección vaginal por Monilias en el periodo señalado, que dieron su consentimiento informado de poder utilizar los datos de ellas suministrados y los resultados obtenidos del tratamiento para los fines que los autores pretendía con el estudio; se excluyeron a las que por razones obvias no estaban aptas mentalmente para responder correctamente el formulario de datos aplicados. Las 40 pacientes se distribuyeron al azar a partir del primer caso atendido (por simple lotería se eligió a qué grupo pertenecería el primer paciente, después de ella se alternarían los casos para cada grupo), para lograr que ambos grupos estuvieran representados con el mismo número de casos (1 a 1). La muestra de 40 pacientes representa el 32% del universo definido.
La intervención en el primer grupo (A) consistió en la aplicación tópica de aceite ozonizado con aplicadores estériles en vulva y vagina de cada paciente. El aceite ozonizado empleado fue el OLEOZON® de fabricación cubana, en frascos de 30 mililitros, producido por los laboratorios Dalmer cuya aplicación tópica se realizó de forma diaria posterior a limpieza de vulva y vagina con solución salina al 0,9%. La duración total del tratamiento fue de 12 días.
El segundo grupo (B) fue tratado con tratamiento convencional con nistatina en crema (100 000 U/g) x 1.5 g aplicada dos veces al día durante 12 días y nistatina en tabletas vaginales (100 000 U) una vez al día durante el mismo periodo de tiempo en las noches, el cual fue aplicado por la paciente en su hogar y se corroboró el cumplimiento del mismo al siguiente día cuando se le realizaba el examen con espéculo donde quedaban restos de la tableta.

CONCLUSIONES

- Los grupos de edad más representados fueron los de 21 a 30 años seguido de 31 a 40 años. Entre tratamientos la edad no mostró diferencias notables.
- Predominó en el grupo de pacientes estudiadas las que tienen pareja estable y su comportamiento según el tipo de tratamiento muy similar.
- Solo 8 mujeres del estudio presentaron antecedentes patológicos personales: el tratamiento prolongado con antibiótico y el uso continuado de esteroides los principales.
- Predominó una higiene adecuada en las féminas del estudio, según los grupos de tratamiento fue ligeramente superior en las que utilizaron tratamiento con Oleozón tópico.
- Se evidenció que en las tratadas con Oleozón tópico 19 de 20 curaron antes de los 6 días, manifestando tolerancia y efectividad elevadas.

Predominó el grupo etario de 21 a 30 años en ambos grupos estudiados y se observó ligero predominio de pacientes con pareja sexual estable en el grupo que usó tratamiento convencional.
Prevaleció el antecedente de tratamiento prolongado con antibiótico en las pacientes tratadas con Oleozón tópico y el uso continuado de esteroides en las que usaron el tratamiento convencional.
En el grupo de las tratadas con Oleozón tópico se observó una mayoría de pacientes con hábitos higiénicos adecuados.
Al comparar el resultado obtenido en ambos grupos se observó que el 95 % de las pacientes tratadas con Oleozón tópico solucionó en menos de seis días la infección, demostrando que el tratamiento con Oleozón tópico en la infección vaginal por Monilias fue más efectivo que el tratamiento convencional con nistatina en tabletas vaginales y crema.